



積分の手法の確認

★ 積分の基本的な解き方をしっかり押さえておこう

1 基本となる関数の積分

※ 微分する前の関数をイメージ

$$\int \boxed{\text{微分した後}} dx = \boxed{\text{微分する前}} + C$$

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1) \quad \int \frac{1}{x} dx = \log|x| + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C \quad \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x dx = -\log|\cos x| + C \quad \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\frac{1}{\tan x} + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C \quad \int \log x dx = x \log x - x + C$$

3 積→和、次数は下げて

$$\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

例 $\int (x+a)^3 dx = \int (x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3) dx \leftarrow \text{展開}$

$$\int \frac{1}{x(x+2)} dx = \int \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} \right) dx \leftarrow \text{部分分数分解}$$

$$\int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx \leftarrow \text{半角の公式}$$

5 置換積分 $x = g(t)$

※ 4つの置き換えパターンを確実に

$$\int f(x) dx = \int f(g(t)) g'(t) dt$$

① $\sqrt{a^2 - x^2} \rightarrow x = a \sin \theta \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$

② $\frac{1}{a^2 + x^2} \rightarrow x = a \tan \theta \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$

③ $\sqrt{ax+b} \rightarrow t = \sqrt{ax+b}$ において

$$x = \frac{1}{a}(t^2 - b) \text{ とする}$$

④ e^x の式 $\rightarrow t = e^x$ において $x = \log t$ とする

2 1次式のかたまりを

$$\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$$

① $f(x)$ を積分すると $F(x)$

② 1次式のかたまり $ax+b$ を微分してできる

余計な部分を調整するために $\frac{1}{a}$ が必要

③ まとめることで上の式が完成

4 置換積分 $t = g(x)$

※ 不定積分～

$$\int f(g(x)) g'(x) dx \quad (\text{合成関数}) \times (\text{かたまり})' \text{ をみたら...}$$

$$t = g(x), dt = g'(x) dx \text{ の活用で } \int f(t) dt \wedge$$

※ 定積分～次の3つに注目

①積分変数 ②積分区間 ③積分される関数

$t = g(x)$ において、3つを変えると

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{\frac{g(a)}{g(a)}}^{\frac{g(b)}{g(a)}} f(t) dt$$

6 部分積分法

※ 不定積分～

$$f(x) \times g'(x) \text{ に対して } f'(x) \times g(x) \text{ は?}$$

一度下書きすることで、一気に

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) - \int f'(x) g(x) dx \wedge$$

※ 定積分～

原始関数が求まったところから数値代入

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = [f(x) g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

どのパターンを用いるか、または複合的に用いるかの判断は練習で身に付けよう！

中にはこれ以外の特殊なケースや、問題の指示に従いながら解くケースも…